

	Produkt (Handelsname)	Verwendung	Nebenwirkungen	Haltbarkeit	Vorteile
Permanent					
Silikon, Silikonderivate (Dimethylsiloxan-Polymere)	Silikonelastomer (Bioplastique®)	tiefe Falten (Nasolabialfalte)	Wanderung des Materials, Entstehen von Dellen u. Hautverfärbungen, allergische Reaktionen, Granulombildung, Auslösung v. Autoimmunreaktionen vergleichsweise viele Risiken und Nebenwirkungen	lange bis permanent	
Acrylate	Artecoll® - Suspension aus Polymethylmethacrylat (PMMA), Kollagen und Lidocain	mittlere bis tiefe Falten, periorale Falten, Gewebeaugmentation; Kontraindikation: atrophische Haut	Hauttest vor der Injektion empfohlen wegen des Kollagenanteils	mind. 2 Jahre	weitreichende Erfahrungen dokumentiert
Nicht permanent (resorbierbar)					
Kollagen	Zyderm I® , Zyderm II®, Zyplast®	flache Augen- und Lippenfältchen, auch tiefe Zornes-, Nasolabialfalten	Hauttest empfohlen wegen des Allergiepoteziels auf tierisches Protein	ca. 3-12 Monate	langjährige Erfahrung
Hyaluronsäure	quervernetzt: Restylane® (4 verschied. Produkte), Juvederm® (4 verschied. Produkte), Hylaform® (3 verschied. Produkte), Viscontour® flüssig: Hyal System®	flache bis tiefe Falten, eingesunkene Narben, Lippenaugmentation (quervernetzte Formen); großflächige Gewebeaugmentation (flüssige Formen)	Sensibilisierung insbes. bei Produkten tierischen Ursprungs möglich	quervernetzt: 6-12 Monate, flüssig: 4 Monate	feine Korrekturen möglich, selten allergische Reaktionen
Poly-L-Milchsäure	New-Fill®	tiefe Falten (z.B. nasolabial), Volumenaugmentation	evtl. Knötchenbildung	ca. 1 Jahr	immunologisch inert
Semipermanent					
	DermaLive®, Derma-Deep® (Gemische aus Hydroxyethylmethacrylat, Ethylmethacrylat u. Hyaluronsäure)	mittlere bis tiefe Falten		lange bis dauerhaft	